



YouTube Francesco Pastore



S.I.M.B.A.

Dott. Francesco Pastore
cell. +39 338 9451132
francesco.pastore60@tin.it
SIMBA - Manovre per la vita



LATTANTE COSCIENTE

OSTRUZIONE TOTALE

- Non piange
- Non tossisce
- Non parla e non emette alcun suono



Manovre di disostruzione delle vie aeree

1 Nel momento in cui ci rendiamo conto che il lattante non respira, non piange, non tossisce e cambia colore, la prima cosa da fare è allertare i sistemi medici di emergenza, chiamando il numero 118 o 112.



Con la mano assicurare il capo del lattante fissando la mandibola tra il pollice e indice posizionati a "C".



(0 - 1 anno) LATTANTE



Disporre il lattante prono (pancia in giù) sull'avambraccio. Posizionare a sua volta l'avambraccio sulla coscia dello stesso lato, per garantire la stabilità e far sì che le manovre siano efficaci, facendo attenzione a non iperestendere il capo del lattante. Effettuare subito **5 pacche interscapolari** avendo cura di non colpire il capo.



Girare il lattante sull'altro avambraccio, sempre in posizione declive, assicurandolo sul piano rigido formato da avambraccio e coscia.



Posizionare perpendicolarmente l'indice ed il medio al di sotto dello sterno, subito sotto la linea immaginaria che collega i capezzoli del lattante ed eseguire **5 compressioni toraciche** lente e profonde.

Alternare le 5 pacche interscapolari alle 5 compressioni toraciche fino a quando l'ostruzione non si risolve o il lattante diventi **INCOSCIENTE**: in questo caso si inizia il protocollo di rianimazione cardiopolmonare che si può imparare nei corsi certificativi BLSD/PBLSD o PBL. **Nell' OSTRUZIONE PARZIALE evitare qualsiasi manovra di disostruzione e favorire la tosse.**

LATTANTE L'INTELLIGENZA È UNO DEI PIÙ GRANDI DONI CHE LA NATURA HA FATTO ALL'UOMO



YouTube Francesco Pastore



S.I.M.B.A.

Dott. Francesco Pastore
cell. +39 338 9451132
francesco.pastore60@tin.it
SIMBA - Manovre per la vita



BAMBINO E ADULTO COSCIENTI

OSTRUZIONE TOTALE

- Non piange
- Non tossisce
- Non parla e non emette alcun suono



Manovre di disostruzione delle vie aeree

1
Sopra l'anno di età, in caso di ostruzione totale, su pazienti coscienti, dopo aver allertato i sistemi medici di emergenza (118 a breve 112), si esegue la manovra di HEIMLICH.



2
Posizionare le braccia al di sotto di quelle del bambino, abbracciandolo all'altezza dell'addome superiore. Con il pollice e l'indice di una mano formare una "C" che colleghi il margine inferiore dello sterno all'ombelico.



(sopra l'anno di età) BAMBINO



3
Porre il pugno dell'altra mano all'interno di questa "C", avendo cura di mantenere il pollice all'interno delle altre dita per creare una superficie piana.

4
Staccare la prima mano e porla al di sopra dell'altra. Eseguire le compressioni dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno (movimento "a cucchiaio"), finchè il bambino non rimane cosciente o l'ostruzione si risolve.



Soffocamento...e "segno delle mani intorno al collo"



ADULTO



Nel caso in cui diventi incosciente si iniziano anche qui le manovre di rianimazione cardio-polmonare che si possono imparare in un corso certificativo BLSD/PBLSD o PBLSD. **Nell'OSTRUZIONE PARZIALE** delle vie aeree non bisogna intervenire, incoraggiare il paziente a tossire.

Bambino Adulto

MANOVRA DI HEIMLICH LINEE GUIDA INTERNAZIONALE 2015



PIANO STRATEGICO PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE NELLA SCUOLA

CATALOGO ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018